

Podsetnik za pacijente koji uzimaju lek Daranda (ambrisentan)

ŠTA JE VAŽNO DA ZNATE

U studijama koje su rađene na životinjama utvrđeno je da ambrisentan može da izazove urođene defekte.

Ukoliko ste žena na terapiji lekom Daranda:

- **ne smete uzimati lek Daranda ukoliko ste trudni** ili ukoliko planirate da ostanete u drugom stanju.
- **morate koristiti pouzdane metode prevencije trudnoće (kontracepciju)** dok koristite lek Daranda.
- **test trudnoće je potrebno raditi svakog meseca.**
- ukoliko Vam izostane menstruacija ili sumnjate da ste trudni, morate odmah obavestiti svog lekara.

Lek Daranda može da izazove oštećenje jetre. Važno je redovno raditi laboratorijske analize krvi radi provere da li je funkcija jetre zadovoljavajuća.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili drugog zdravstvenog radnika. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u Uputstvu za lek. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka.

Sumnju na neželjene reakcije na lek možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) putem:

- online prijave dostupne na internet stranici www.alims.gov.rs ili
- popunjavanjem obrasca za prijavu neželjene reakcije za pacijenta koji je dostupan na internet stranici www.alims.gov.rs i slanjem poštom na adresu Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije, Nacionalni centar za farmakovigilancu, Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd, Republika Srbija, ili elektronskom poštom na adresu nezeljene.reakcije@alims.gov.rs.

Sumnju na neželjene reakcije na lek možete prijaviti i nosiocu dozvole za lek Daranda:

Hemofarm A.D., Prote Mateje 70., 11000 Beograd, Republika Srbija, tel. 011-381-1298, 011-381-1351.