
KARTICA SA UPOZORENJIMA ZA PACIJENTA

Mentela® (agomelatin)

Lek Mentela je antidepresiv koji Vam može pomoći u lečenju depresije. Da biste dobili optimalnu terapiju, pratite preporuke svog lekara u pogledu uzimanja leka Mentela (doza, trajanje terapije, ponovni kontrolni pregledi kod lekara, analize krvi).

Preporuke kako da izbegnete neželjena dejstva na jetri

Lek Mentela može da uzrokuje neželjena dejstva, uključujući promene u funkcionisanju jetre.

Ovaj vodič Vam daje savet:

- **kako da izbegnete neželjena dejstva na jetri**
- **šta da uradite ukoliko se takva neželjena dejstva jave tokom lečenja lekom Mentela**

Pitajte Vašeg lekara ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije.

Za preciznije informacije, molimo Vas pogledajte Uputstvo za lek koje se nalazi u pakovanju leka Mentela.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili drugog zdravstvenog radnika. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u Uputstvu za lek. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka.

Sumnju na neželjene reakcije na lek možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) putem:

- online prijave dostupne na internet stranici www.alims.gov.rs ili
- popunjavanjem obrasca za prijavu neželjene reakcije za pacijenta koji je dostupan na internet stranici www.alims.gov.rs i slanjem poštom na adresu Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije, Nacionalni centar za farmakovigilancu, Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd, Republika Srbija, ili elektronskom poštom na adresu nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

Sumnju na neželjene reakcije na lek možete prijaviti i nosiocu dozvole za lek Mentela:

Hemofarm A.D., Prote Mateje 70., 11000 Beograd, Republika Srbija, tel. 011-381-1304, 011-381-1351, e-mail: nezeljena.dejstva@hemofarm.com

Šta je potrebno da uradite pre primene leka Mentela?

- Recite Vašem lekaru ako imate probleme sa jetrom: u tom slučaju nemojte uzimati lek Mentela.
- Mogu postojati i drugi razlozi zbog kojih lek Mentela možda nije odgovarajući za Vas.

Molimo Vas da se u sledećim slučajevima obratite svom lekaru za savet:

- Ako ste ikada imali probleme sa jetrom,
- Ako imate prekomernu telesnu masu,
- Ako imate dijabetes,
- Ako konzumirate alkohol,
- Ako uzimate druge lekove (za neke se zna da utiču na jetru).

Šta je potrebno da uradite kako biste izbegli probleme sa jetrom tokom lečenja?

- Redovno radite analize krvi

Zbog čega?

- Trebalo bi da je **pre započinjanja terapije** Vaš lekar proverio da li Vaša jetra funkcioniše kako treba. Analize krvi koje Vaš lekar traži mu govore o tome **kako Vaša jetra funkcioniše** i da li je lek Mentela pogodan za Vas.
 - Tokom terapije lekom Mentela moguće je da će se nivoi enzima jetre kod nekih pacijenata povišiti. Nivoi ovih enzima jetre pokazuju da li Vaša jetra ispravno funkcioniše ili ne, i izuzetno su važni za Vašeg lekara kada prati Vašu terapiju.
-

Kada?

	Pre započinjanja lečenja ili pre povećanja doze	Oko 3 nedelje kasnije	Oko 6 nedelja kasnije	Oko 3 meseca kasnije	Oko 6 meseci kasnije
Analize krvi	✓	✓	✓	✓	✓

Ako Vam doktor poveća dozu na 50 mg, analize krvi se moraju ponoviti.

Nemojte zaboraviti da ponesete sa sobom ovu karticu koja sadrži **PODSETNIK ZA ANALIZE KRVİ** (vidite sledeću stranu) kada budete išli na kontrolu kod svog lekara.

Odmah obavestite svog lekara ako dobijete informaciju da su Vam nivoi enzima jetre povećani tokom terapije.

- **Budite na oprezu u vezi pojave znakova problema sa jetrom**

Ako primetite bilo šta od dole navedenog, Vaša jetra možda ne funkcioniše kako treba:

- žuta koža/oči,
- tamnija mokraća,
- stolica svetle boje,
- bol u desnom gornjem delu stomaka,
- neobičan umor (naročito povezan sa drugim, gore navedenim simptomima).

Hitno potražite savet lekara koji će Vam možda savetovati da prestanete sa uzimanjem leka Mentela.

VAŠ PODSETNIK ZA ANALIZE KRVI

ZAPAMTITI

Važno je da redovno radite analize krvi dok uzimate lek Mentela.

**OVA TABELA ĆE VAM POMOĆI DA LAKŠE PRATITE
ZAKAZANE TERMINE ZA ANALIZE KRVI.**

MENTELA 25 MG – DATUM ZAPOČINJANJA TERAPIJE:

Raspored analiza krvi za enzime jetre	Datum
Datum prve analize (pri započinjanju terapije)	
Datum druge analize (posle oko 3 nedelje)	
Datum treće analize (posle oko 6 nedelja)	
Datum četvrte analize (posle oko 3 meseca)	
Datum pete analize (posle oko 6 meseci)	

Vaš lekar može odlučiti da su potrebne i dodatne analize krvi.

POVEĆANJE DOZE NA 50 MG – DATUM ZAPOČINJANJA TERAPIJE:

Raspored analiza krvi za enzime jetre	Datum
Datum prve analize (kod povećanja doze leka Mentela na 50 mg)	
Datum druge analize (posle oko 3 nedelje)	
Datum treće analize (posle oko 6 nedelja)	
Datum četvrte analize (posle oko 3 meseca)	
Datum pete analize (posle oko 6 meseci)	

Vaš lekar može odlučiti da su potrebne i dodatne analize krvi.



Hemofarm
STADA GRUPA