

UPUTSTVO ZA LEK

Stanacid, 20 mg/g, mast

fusidinska kiselina

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.
- Ovaj lek propisan je samo Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.
- Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek Stanacid i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Stanacid
3. Kako se primenjuje lek Stanacid
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Stanacid
6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Stanicid i čemu je namenjen

Lek Stanicid kao aktivnu supstancu sadrži natrijum-fusidat i pripada grupi lekova koji se zovu antibiotici. Koristi se u lečenju stanja u kojima je koža inficirana bakterijama, kao što su:

- impetigo (gnojno zapaljenje kože sa pojavom bistrih mehurića koji se brzo zamute i sasušu u kraste žućkaste boje),
- površinski folikulitis (površinsko zapaljenje korena dlake, sa crvenilom, svrabom i gnojem ispunjenim mehurićima),
- sikozi barbe (javlja se kod muškog pola kao hronično zapaljenje korena dlake u predelu brade, sa čvorićima koji gnoje, praćeni crvenilom, peckanjem i bolom),
- paronihija (zapaljenje kože oko nokatne ploče, praćeno crvenilom, otokom, bolom i gnojenjem),
- eritrazma (površna infekcija kože u predelu pregiba, npr. pazuha, prepona, između prstiju, sa crvenilom i svrabom),
- inficirani ekcematoidni dermatitis (zapaljenje kože oko vlažnih rana ili grizlica na koži, sa crvenilom i povremeno sa mehurićima),
- inficirani kontaktni dermatitis (zapaljenje kože sa crvenilom, svrabom i zagnojenim plikovima),
- inficirane posekotine i ogrebotine.

2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Stanicid

Lek Stanicid ne smete primenjivati:

Ukoliko ste alergični (preosetljivi) na fusidinsku kiselinu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što primenite lek Stanicid mast.

- Budite posebno oprezni ukoliko lek nanosite na lice posebno u predelu Vaših ili detetovih očiju,
- Primena tokom dužeg vremenskog perioda ili u većoj količini, lek povećava mogućnost pojave neželjenih dejstava. Takođe, Vaša koža može postati preosetljiva na ovaj lek.

Ne pušite i ne približavajte se otvorenom izvoru plamena jer postoji rizik za nastanak teških opekotina. Tkanina (odeća, posteljina, zavoji itd.) koja je bila u kontaktu sa ovim proizvodom lakše gori i predstavlja ozbiljnu opasnost od požara. Pranje odeće i posteljina može smanjiti nakupljanje proizvoda ali ga ne može u potpunosti ukloniti.

Drugi lekovi i lek Stanicid

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko primenjujete donedavno ste primenjivali ili ćete možda primenjivati bilo koje druge lekove, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što primenite ovaj lek.

Nemojte koristiti ovaj lek duži vremenski period ili u većoj količini.

Ako lek Stanicid mast koristite u periodu dojenja, nemojte je primenjivati u predelu dojki.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Lek Stanicid ne utiče ili ima zanemarljiv uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

Ukoliko se kod Vas ispolji bilo koje neželjeno dejstvo koje bi moglo da Vas onemogući u upravljanju vozilima ili u rukovanju mašinama, obratite se Vašem lekaru.

Lek Stanicid sadrži lanolin i cetilalkohol

Lek Stanicid mast sadrži lanolin i cetilalkohol koji mogu izazvati lokalne reakcije na koži (npr. kontaktni dermatitis - zapaljenje kože sa crvenilom i svrabom). Ukoliko do toga dođe, obratite se Vašem lekaru.

3. Kako se primenjuje lek Stanicid

Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Lek Stanicid mast se nanosi isključivo na kožu. Nemojte ga gutati. Nije namenjen za unutrašnju upotrebu.

Uvek operite ruke pre primene leka Stanicid mast. Blago, bez pritiskanja utrljajte mast u kožu. Ukoliko nanosite mast na kožu lica, obratite pažnju da mast ne dođe u kontakt sa očima. Ukoliko do toga ipak dođe (može se javiti osećaj peckanja u oku), isperite oči hladnom vodom. Ukoliko Vam se jave smetnje sa vidom ili oko postane bolno, odmah se obratite lekaru.

Nakon primene leka Stanicid mast, uvek operite ruke, osim ako ste ga u cilju terapije naneli baš na ruke.

Lek Stanicid mast se može primenjivati sa ili bez zavoja, na obolelo mesto 3 do 4 puta dnevno (ako se primenjuje pod zavojem, redá primena može biti odgovarajuća). Imajte na umu da se pelena kod bebe takođe ponaša kao zavoj. Pratite savete Vašeg lekara.

Ako ste primenili više leka Stanicid nego što treba

Ukoliko slučajno primenite previše leka Stanicid mast ili progutate malu količinu, malo je verovatno da će to štetno uticati na Vas. Ukoliko progutate veliku količinu masti kontaktirajte Vašeg lekara ili farmaceuta.

Ako ste zaboravili da primenite lek Stanicid

Ako ste zaboravili da primenite lek Stanicid mast, primenite ga čim se setite. Nastavite sa primenom leka prema uobičajenom režimu.

Ukoliko imate bilo kakva dodatna pitanja o primeni ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

Ako naglo prestanete da primenjujete lek Stanicid

Nećete osetiti nikakve promene ako naglo prestanete sa primenom leka Stanicid mast. Nemojte da prestanete sa primenom leka Stanicid bez savetovanja sa lekarom, čak i ako primećujete poboljšanje.

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, lek Stanicid mast može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji primenjuju ovaj lek.

Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek)

U slučaju pojave nekog od sledećih simptoma i znakova, odmah se obratite lekaru, s obzirom na to da može biti u pitanju reakcija preosetljivosti:

- otežano disanje,
- oticanje lica ili grla,
- pojava teškog osipa po koži.

Druga moguća neželjena dejstva su:

Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

- bol na mestu primene (uključujući i osećaj peckanja na koži),
- iritacija na mestu primene (peckanje i crvenilo kože),
- dermatitis (zapaljenjske promene na koži, uključujući kontaktni dermatitis i ekcem)
- osip (može da se ispolji u vidu crvenila, mehurića ispunjenih bistrim tečnim sadržajem, mehurića ispunjenih gnojem, čvorića sa ili bez crvenila, u vidu osipa koji zahvata veće površine kože),
- svrab,
- crvenilo.

Ostala retka neželjena dejstva:

- konjunktivitis (zapaljenje vežnjače oka),
- koprivnjača,
- plikovi na koži.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek Stanicid

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Stanicid mast posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon „Važi do:“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Lek čuvati na temperaturi do 25°C.

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja leka: nakon prvog otvaranja lek se čuva u zatvorenoj tubi i može se upotrebiti do isteka roka upotrebe.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju baciti u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Stanicid

Aktivna supstanca je natrijum-fusidat.

Jedan gram masti sadrži 20 mg natrijum-fusidata.

Pomoćne supstance su: cetilalkohol; lanolin; parafin, tečni; parafin, meki.

Kako izgleda lek Stanicid i sadržaj pakovanja

Providna, homogena mast, bledo žute boje.

Unutrašnje pakovanje leka je aluminijumska tuba sa plastičnim zatvaračem, koja sadrži 10 g masti.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna aluminijumska tuba (ukupno 10 g masti) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

HEMOFARM AD VRŠAC,
Beogradski put bb, Vršac, Republika Srbija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Septembar, 2022.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.

Broj i datum dozvole:

515-01-02927-21-001 od 01.09.2022.